

## INSTRUCTIVO PARA RECOLECCION DE MUESTRA **ACIDO HOMOVANILICO (HVA) – ACIDO VAINILLIN MANDELICO (AVM)**

### **Requerimientos:**

- » Evite, si es posible ciertos medicamentos, tales como la L-dopa, el paracetamol, los salicilatos y jarabes para la tos que contengan guaifenesina. Consulte a su médico.
- » Informar si está tomando medicación.
- » NO debe ingerir durante 2 días previos a la realización del análisis, bananas, tomates, paltas, berenjenas, ananás, ciruelas, maníes, nueces, vainillas, postres, dulces y golosinas que contengan vainilla, chocolate, no tomar mate, té ni café.

### **Método de Recolección:**

- » Recolecte al tercer día una muestra de orina de 24 horas en un recipiente adecuado, manteniendo siempre la dieta.

Ejemplo, primera orina a las 8:00 hs se descarta; a partir de ese momento recoger todas las micciones hasta las 8:00 hs de la mañana del día siguiente inclusive.

Conservar el recipiente refrigerado entre 2-8°C (heladera) durante toda la recolección.

- » Debe remitirse al laboratorio el TOTAL de la orina.

**“La toma de muestra es el principio de un buen análisis.”**

ITCH-28 Rev-05